



가정통신문

튼튼 2020 - 12호
2020. 6. 22. ~ 6. 26.

몸도 튼튼 마음도 튼튼 슬기도 튼튼 | www.tuntun.or.kr

02) 2604-4151

▣ 교육행사 및 가정준비물

구 분	22일(월)	23일(화)	24일(수)	25일(목)	26일(금)
가정 준비물	-도시락, 수저통, 물통 (매일준비) -실내화 -그림일기(만5세)	-	-언어전달 -나는 책이 좋아요 (만4,5세)	-	-실내화를 가지고 갑니다. 세탁 후 보내주세요.

1. 1학기 학부모 상담에 협조해 주셔서 감사합니다.

학부모 상담이 이루어졌습니다. 코로나 19로 인해 직접 뵙지 못하고 전화로 진행한 상담에 협조해 주신 가정에 감사드리며 상담한 내용을 바탕으로 아이들 지도에 힘쓰도록 하겠습니다. 추후에도 궁금하신 사항은 4시 이후에 편하게 전화주시고, 만5세는 24일(수)까지 이루어 집니다.

2. 언어전달 안내

연 령	언어전달 내용
만3세반	모양놀이
만4세반	우물 안 개구리
만5세반	안전제일(安全第一) - 안전이 최고다

3. 방과후 영어 STORIX 가정연계 활동을 위한 온라인 학습 안내

방과후 과정 영어 프로그램 교육의 효과를 높이고자 가정에서도 할 수 있는 온라인 학습 방법을 안내 드립니다. 별지로 보내드리는 내용을 확인하시고 가정에서 활용해 주시기 바랍니다.

4. 유아 건강검진 시스템 연계에 따른 개인 정보 제공 동의서 제출 안내

현재 자녀의 개월 수에 맞추어 건강검진을 실시한 후 건강검질 결과 통보서를 유치원에 제출하는 번거로움을 해소하고자 건강검진 결과서 시스템 연계에 동의하시는 분들에 한해 별도의 결과 통보서를 제출하지 않아도 유치원에서 확인하여 생활기록부에 기재가 가능하도록 시스템을 정비중에 있습니다. 별지의 내용을 확인하시고 건강검진 결과 시스템 연계에 동의하시는 가정에서는 동의서를 22일(월)까지 제출해 주시기 바랍니다.

(미동의시에는 현재처럼 건강검진 후 결과서를 유치원에 제출해주시기 바랍니다.)

5. 코로나 19 방역 소독 실시 안내

원에서는 매일 각반 교사가 청소와 소독을 실시하고 있으며 매주 1회는 원에서 구매한 소독 기계와 소독액을 이용하여 원 전체 및 차량에 소독을 실시하고 있습니다. 주말 동안 무분별한 외출을 삼가고 부득이 외부 외출시에는 마스크를 꼭 착용하고, 손 소독을 철저히 해주시기 바랍니다.



[가정 돌봄이 필요한 감염병 안내]

더워지는 날씨에 유행하는 전염성 질환에 대해 안내드립니다. 코로나 19로 힘든 상황이지만 기타 다른 질병에도 노출 될 수 있으므로 유아 개인 위생과 건강 관리에 신경써 주시기 바랍니다. 또한 질병에 감염된 경우는 병원의 완치 통보서 혹은 완치 되었다는 진료 확인서 발급 후 등원 가능합니다. 질병에 감염된 유아는 유치원으로 꼭 알려주시기 바랍니다.

□ 유아들이 자주 걸리는 감염성 질환의 특성(등원 중지 기간 참조)

질 병	전파경로	잠복기	전염가능 기간	임상증상
			등원중지 기간	
수두	비말 에어로졸	10일 ~ 21일 (14일 ~ 16일)	수포가 생기기 1일 ~2일 전부터 모든 수포에 가피가 형성이 될 때 까지 모든 수포에 가피가 형성이 될 때 까지	발열, 피로감, 피부발진, 수포
유행성 이하선염	비말	7일 ~ 23일 (14일 ~ 18일)	침샘이 커지기 1일 ~ 2일 전부터 모두 가라앉을 때까지 또는 증상발현 후 9일까지 증상발현 후 9일 까지	발열, 두통, 근육통, 이하선 부종
홍역	비말 에어로졸	7일 ~ 18일	발진이 나타난 후 5일 까지 발진이 나타난 후 5일 까지	발열, 기침, 콧물, koplik 반점, 발진
인플루엔자	비말	1일 ~ 5일 (2일)	증상 발생 1일 ~ 2일 전부터 7일 혹은 증상이 소진될 때 까지 등원중지는 의미가 없으나 치료 위해 휴식 필요	발열, 두통, 근육통, 인후통, 기침, 객담
백 일 해	비말	7일 ~ 20일 (5일 ~ 10일)	카타르기에 가장 전염성이 높으며 증상 발생 4주 후에는 전염성이 소실 항생제 투여 후 5일 까지	상기도 감염 증상, 발작적 기침, 구토
뇌수막염	비말	2일 ~ 10일	바이러스 : 5~7일 세균 : 적절한 항생제 치료 후 24~48시간 뇌수막염 학생은 입원치료	발열, 두통, 구토, 의식저하
수족구병	비말 수포액	3일 ~ 7일	발병 후 7일, 피부 병변에 액체가 남아있는 동안 수포 발생 후 6일간 또는 가피가 형성될 때 까지	발열, 손, 발바닥 및 구강 내 수포 및 궤양
유행성 각결막염	환자와 접촉	12시간 ~ 3일	잠복기 이후부터 발병 후 2주까지 증상이 사라진 후 2일 경과할 때까지	안통, 충열, 이물감, 많은 눈물, 눈곱, 눈부심등
노로 바이러스	분변-구강	24시간 ~ 48시간	설사가 멈추고 48시간 후까지 가능 치료 완료시까지	오심, 구토, 복통, 권태감, 열, 설사